

Institutul  
Național de  
Sănătate Publică

Împreună pentru  
sănătatea României!

# PROGRAMUL NAȚIONAL DE VACCINARE



MINISTERUL  
SĂNĂȚĂII




## ***Obiectiv***

***Protejarea sănătății populației împotriva bolilor transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare a populației.***

## ***Activități:***

- vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;***
- vaccinarea grupelor populaționale la risc.***





# Calendarul național de vaccinare

Vaccinurile incluse în calendarul național de vaccinare sunt puse la dispoziția populației gratuit

Vârsta recomandată	Tipul de vaccinare	Comentarii
primele 24 de ore, 2-7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep B)2) Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)	în maternitate
2 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie
4 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie
11 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie
12 luni	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	medicul de familie
5 ani	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	medicul de familie
5-6 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)	medicul de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (dTpa)	medicul de familie



## Calendarul național de vaccinare

### NOTĂ:

- Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.
- În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

Vârsta recomandată	Tipul de vaccinare	Comentarii
6 săptămâni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I	Medical de familie
30 de zile de la prima doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II	Medical de familie
30 de zile de la a doua doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III	Medical de familie



# VACCINAREA GRUPELOR POPULAȚIONALE LA RISC

Tipul de vaccinare	Grupe populaționale la risc
Vaccin împotriva COVID-19	la solicitare, la medicul de familie
RRO	contactii din focar
alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătății și aplicabile în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internațională	persoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecțioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), imigranți, refugiați, azilanți

